

Riesgos de la Colonoscopia y la Gastroscofia

Nuestro objetivo principal es el de ofrecerle el mejor cuidado al sistema digestivo de una forma segura, con gran calidad y de manera amistosa.

Sin embargo, al igual que con otros procedimientos médicos, existen algunos riesgos.

Nuestro centro ha establecido procedimientos y pólizas para controlar y minimizar los riesgos a nuestros pacientes.

Para su información, hemos listado a continuación los posibles riesgos de la colonoscopia y la gastroscopia.

Problemas comunes	¿Que Sucede?	¿Cómo Tratamos el Problema?
Hinchazón & molestia abdominal	Puede que quede algo de aire en el intestino grueso como consecuencia del procedimiento	Usualmente no se requiere tratamiento. Al caminar y moverse ayuda a que salga el aire atrapado.
Nauseas y vómitos. confusión en el lugar de la inyección	Algunas personas experimentan nauseas y/o vómitos como resultado de la anestesia. Otros pueden experimentar dolor y enrojecimiento o hemorragia en el lugar de la inyección.	Las nauseas y los vómitos generalmente se pueden erradicar rápidamente al administrar al paciente los medicamentos apropiados. La hemorragia se puede detener aplicando presión al área afectada. Se pueden aplicar vendajes bien firmes y compresas frías para disminuir la contusión. Esta contusión no es muy seria y deberá desaparecer en el plazo de una semana.
Reacción a la preparación del intestino	Ocasionalmente algunos pacientes pueden experimentar dolores de cabeza y una reducida absorción de otros medicamentos como la píldora anticonceptiva o anticonvulsiva. También pueden ocurrir cambios en los niveles de sal en la sangre (electrolitos).	Se recomienda tomar los medicamentos al menos 2 horas antes de la preparación. Es posible que administremos líquidos por vía intravenosa y medicamentos para aliviar el dolor de cabeza y las nauseas. Sugerimos que se utilicen otros métodos anticonceptivos hasta el próximo ciclo menstrual.
Problemas poco comunes	¿Que sucede?	¿Cómo Tratamos el Problema?
Hemorragia	Puede ocurrir una hemorragia severa en el estomago o el intestino en uno de cada 10.000 pacientes luego de tener una biopsia y en uno de cada 1000 pacientes luego de extirpársele un pólipo. En algunos casos puede haber hemorragia hasta 12 días después del procedimiento.	La hemorragia se detiene por sí sola en la mayoría de los casos sin requerir otra intervención. En algunos casos se requiere de otra gastroscopia o colonoscopia para detener la hemorragia luego de una extirpación de pólipos. En muy raras ocasiones, habrá que remitirlo a un hospital para observarlo. También a veces se requiere de una transfusión de sangre o una intervención quirúrgica.
Dolores abdominales	Una de cada 500 personas puede experimentar escozor en la pared intestinal luego de extirpársele los pólipos. Esto puede causar severos dolores abdominales, pulso acelerado y fiebre, luego de las primeras 12 horas y hasta 5 días después del procedimiento.	La mayoría de los problemas deberán subsistir luego de 48 horas, pero usted deberá contactarnos e acudir al hospital para hacerse un chequeo para asegurarse de que no se ha perforado el intestino. Puede ser necesario que necesite antibióticos, un rayos-X, un análisis de sangre y que le observamos en el hospital. También es posible que pidamos la opinión de un especialista.
Problemas excepcionales	¿Que sucede?	¿Cómo Tratamos el Problema?
Perforación (punción o desgarro del intestino grueso, del estomago o del esófago)	En una colonoscopia, en raras ocasiones puede perforarse el intestino grueso, uno de cada 5000 casos. El riesgo es más elevado, un 1%, si se extirpa un pólipo. En una gastroscopia el riesgo de perforación de la tripa (esófago) es menos de un 1% si se realiza una dilatación.	Administramos líquidos y antibióticos por medio de un suero intravenoso y puede que se requiera de intervención quirúrgica al abdomen o el pecho para reparar el desgarro.
Cáncer no detectado	Debido a la anatomía y la preparación del intestino, es posible que no se detecten algunos cánceres pequeños u otras anomalías en aproximadamente uno de cada 1000 procedimientos.	
Daño a los dientes	Hemos hecho grandes esfuerzos en proteger los dientes de los pacientes, sin embargo, es posible que sean dañados los dientes o las coronas durante el procedimiento.	
Riesgos de la anestesia	Una de cada 10.000 personas pueden experimentar problemas del corazón o de los pulmones como son, bajo nivel de oxígeno, baja presión sanguínea o latidos irregulares. Aquellas personas con problemas de salud están expuestas a mayor riesgo.	Se detiene el procedimiento inmediatamente si ocurre algo de esta naturaleza. Podemos administrar medicamentos para contrarrestar el efecto de la anestesia. En algunos casos otros procedimientos serán necesarios. Puede consultar con su anestesista sobre sus preocupaciones.
Aspiración	Algunos pacientes pueden vomitar o experimentar reflujo durante el procedimiento y parte del contenido del estomago puede pasar a los pulmones y causar una neumonía.	Si ocurre una neumonía, usted será transferido al hospital para observarlo y administrarle líquidos y antibióticos por vía intravenosa. Por regla general solo necesitamos observarlo por poco tiempo.
Reacción a las drogas	Algunos pacientes pueden experimentar una reacción alérgica a una o más de una de las drogas anestésicas.	Puede ser que requiera de drogas administradas en vena para detener la reacción y en algunos casos deberá ser transferido al hospital para ser observado.

Al igual que con cualquier otro procedimiento médico, el fallecimiento del paciente es una complicación muy poco probable. Si tiene alguna preocupación con respecto a los riesgos mencionados anteriormente, por favor consulte a su médico antes del procedimiento.

¿PREGUNTAS?: Por favor, no deje de hacernos una visita o de contactarnos por teléfono. Uno de nuestros doctores estará siempre dispuesto a hablar con usted unos días antes de su procedimiento si tiene alguna pregunta. ¡Nos vemos el día de su procedimiento! También podemos coordinar un interprete para usted.

POR FAVOR LEA EL DORSO DE ESTE DOCUMENTO

Translation V3 15/7/04
Spanish